

令和7年12月1日～12月22日学校給食用食及び給食用食材等の放射性物質の測定結果

学校給食センターでは、給食に含まれる放射性物質を毎日子供達が食べる前に測定し、セシウム134・137合わせて20Bq/kgを越えた調理品は提供しないこととしております。（現在までに超過したものはありません。）

測定には、非破壊方式の放射性セシウム測定装置（Legumes Light）を使用し、測定時間5分で行っています。（測定器の設置場所：桑折町学校給食センター）

なお、米飯用の精米は、「桑折町産コシヒカリ」を使用しています。

測定日	品 目	福島県産	測定結果（単位：Bq/kg）
			セシウム134＋セシウム137
12月1日	牛乳	○	検出せず（＜10.79）
	ごはん	○	
	もやしとちくわのナムル	○（にんじん・きゃべつ・もやし）	
	揚げ春巻き		
	中華玉子スープ	○（にんじん・もやし・ねぎ）	
12月2日	牛乳	○	検出せず（＜10.61）
	コッペパン		
	ペンネアラビアータ	○（にんじん）	
	チキンナゲット		
	野菜コンソメスープ	○（きゃべつ）	
	クリームゴールド		
12月3日	牛乳	○	検出せず（＜10.28）
	ごはん	○	
	味付けおかか和え	○（にんじん）	
	サバ和風カレー煮		
	大根のみそ汁	○（はくさい・にんじん）	
12月4日	牛乳	○	検出せず（＜10.69）
	わかめご飯	○（米）	
	レンコンサラダ		
	厚焼き玉子		
	どさんこ汁	○（にんじん・もやし・豚もも肉）	
12月5日	牛乳	○	検出せず（＜10.86）
	カルシウム入りごはん	○（米）	
	ゆかり和え	○（もやし）	
	国産鮭のメンチカツ		
	なめこ汁	○（にんじん）	
12月8日	牛乳	○	検出せず（＜10.24）
	ごはん	○	
	わかめ和え和え	○（にんじん）	
	照り焼き肉団子		
	チャップスイ	○（かまぼこ・はくさい・もやし・にんじん・豚肩肉）	
12月9日	牛乳	○	検出せず（＜9.83）
	コッペパン		
	ごぼうサラダ		
	ウインナー		
	ポトフ風スープ	○（だいこん）	
12月10日	牛乳	○	検出せず（＜8.34）
	ソフト麺		
	からし和え	○（にんじん・もやし）	
	タラ磯辺竜田		
	芋煮かけ汁	○（にんじん・ねぎ・豚肩肉）	

12月11日	牛乳	○	検出せず (<10.58)
	麦ごはん	○ (米)	
	かぶの浅漬け	○ (にんじん)	
	りんご	○	
	キムチ肉じゃが	○ (にんじん)	
	納豆	○	
12月12日	カフェオレ	○	検出せず (<9.47)
	ごはん	○	
	春雨サラダ	○ (もやし・にんじん)	
	サバみそ煮		
	豚汁	○ (白菜・にんじん・ねぎ・豚もも肉)	
	みかん		
12月15日	牛乳	○	検出せず (<10.85)
	ごはん	○	
	チャブチェ	○ (もやし・ねぎ・豚もも肉)	
	ぎょうざ		
	寒天スープ	○ (はくさい・にんじん)	
12月16日	牛乳	○	検出せず (<10.40)
	黒パン		
	ブロッコリーとツナのサラダ	○ (にんじん・もやし)	
	タンドリーチキン	○	
	ミネストローネ	○ (だいこん)	
	クリスマスケーキ		
12月17日	牛乳	○	検出せず (<9.69)
	麦ごはん	○ (米)	
	こんにゃくサラダ	○ (もやし)	
	チキンカレー	○ (にんじん)	
	ヨーグルト	○	
12月18日	牛乳	○	検出せず (<11.40)
	カルシウム入りごはん	○ (米)	
	冬至かぼちゃ	○ (あずき)	
	ホッケフライ		
	鶏ごぼう汁	○ (にんじん・豆腐)	
	はちみつゆずゼリー	○	
12月19日	牛乳	○	検出せず (<11.26)
	ごはん	○	
	サラダスパゲッティ	○ (にんじん・もやし)	
	鶏と豆腐のハンバーグ		
	豆腐と玉ねぎのみそ汁	○ (もやし・豆腐)	
	味付け海苔		
12月22日	牛乳	○	検出せず (<10.62)
	ごはん	○	
	豚肉のうま煮	○ (にんじん・豚肩肉)	
	サバの塩焼き		
	わかめの味噌汁	○ (豆腐)	

測定した数値が検出下限値未満の場合は、「**検出せず**」との測定結果になります。

例えば『検出せず (<8.36)』のように表示されているものは、検出下限値の8.36Bq/kg未満だったため不検出 (ND) であることを示しています。

なお、検出下限値は、測定試料の密度等によって変動が生じます。